

## 「渦が森」環境の森整備とコナラ間伐

午前中は、「国交省グリーンベルト事業」関連の「渦が森」環境の森整備を行います。午後は、大きく育ってきたコナラの間伐作業を事務局の指導で進めます。

1. 日 時：2020. 11. 13 (金) (前日 7 時 30 分降雨確立 50%以上は中止)

2. 集合：10時30分 現地 渦が森バス停

参考：神戸市営バス(料金は¥210 カードOK) 渦森台行き、終点まで 20~25 分乗車。

- ・阪神利用者：御影下車、駅の北側バス乗場(38 系統) 10:10
- ・阪急利用者：岡本下車、南に下り山手幹線を渡った南側のバス停(31 系統) 10:10
- ・JR 利用者：摂津本山下車、北に上った山手幹線のバス停(31 系統) 10:10  
(どのルートを使用するか、事前に各班長に連絡願います。)

3. スケジュール

- 10:30~12:30 環境の森整備活動(下部の間伐予定コナラ中心)
- 12:30~13:30 昼食及びトイレタイム(タクシー確保予定:別紙)
- 13:30~15:15 事務局から来ていただきコナラ間伐の指導をお願いしています。
- 15:15 渦森台で解散 バス便：阪神御影方面 15:21 15:31 (38)  
阪急-JR 方面 15:28 15:57 (31)

4. 持ち物

- ・作業用 熱射病対策含む：飲み物・帽子・長袖・タオル・軍手等 鎌や剪定バサミ
- ・マダニ対策 資料添付してありますので服装等参考にしてください。(本資料後半)  
当日指定忌避剤入りの防虫スプレーを準備します。
- ・必ず昼食を持参ください！！
- ・班長は必ず救急箱・スピーカー持参ください

5. 備考

(1) 当日連絡先 須崎:090-5162-9131

(2) 六甲 SABO の HP

[https://www.kkr.mlit.go.jp/rokko/pr\\_media/plant/group/index.php](https://www.kkr.mlit.go.jp/rokko/pr_media/plant/group/index.php)

## 現地でのトイレ対応の件

今回トイレの対応は次のようにタクシー利用を試行してみます。

1. 日本交通（TEL：078-811-2151）を呼ぶ。15~20分必要
2. 運用は女性に任せます。呼ぶ時間を計画的に進めてください。
3. 渦が森団地の中に「コープ神戸渦森台」があります。



マダニ対策資料（抜粋）

# マダニ対策、今できること

1. マダニの生息場所
2. マダニから身を守る服装
3. マダニから身を守る方法
4. 忌避剤の効果
5. 国内で入手できる忌避剤の種類と特徴



- 参考資料
- 1) マダニの分類とマダニ媒介感染症
  - 2) マダニ媒介SFTSとは
  - 3) マダニの生活環

Kana S. Illustrations  
衛生昆虫写真館 Photos

## マダニ対策に関するお問い合わせ

国立感染症研究所昆虫医科学部  
Tel: 03-5285-1111 (代表)  
Fax: 03-5285-1178  
e-mail: info@nih.go.jp

## SFTS対策全般に関するお問い合わせ

国立感染症研究所  
Tel: 03-5285-1111(代表)  
厚生労働省健康局結核感染症課  
Tel: 03-5253-1111(代表)

昆虫医科学部ホームページ: <http://www.nih.go.jp/niid/ja/sfts/2287-ent/3964-madanitaisaku.html> (2017年5月11日更新)

## 1. マダニの生息場所



マダニは、シカやイノシシ、野ウサギなどの野生動物が出没する環境に多く生息しています。

マダニは、民家の裏山や裏庭、畑、あぜ道などにも生息しています。



Kana S.

## 2. マダニから身を守る服装

野外では、腕・足・首など、肌の露出を少なくしましょう！

首にはタオルを巻くか、ハイネックのシャツを着用しましょう。



半ズボンやサンダル履きは不適當です！

ハイキングなどで山林に入る場合は、ズボンの裾に靴下を被せましょう。



シャツの袖口は、手袋や手袋の中に入れてみましょう。



シャツの裾はズボンの中に入れてみましょう。



農作業や草刈などではズボンの裾は長靴の中に入れてみましょう。

## 3. マダニから身を守る方法

上着や作業着は、家の中に持ち込まないようにしましょう。



屋外活動後は、シャワーや入浴で、ダニが付いていないかチェックしましょう。



ガムテープを使って服に付いたダニを取り除く方法も効果的です。

ダニ類の多くは、長時間（10日間以上のこともある）吸血します。吸血中のマダニを無理に取り除こうとすると、マダニの口器が皮膚の中に残り化膿することがあるので、皮膚科等の医療機関で、適切な処置（マダニの除去や消毒など）を受けて下さい。

マダニに咬まれたら、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状が認められた場合は、医療機関で診察を受けて下さい。

## 4. 忌避剤の効果

**マダニに対する忌避剤（虫よけ剤）**が、2013年から新たに認可されました。現在は、ディート、イカリジンの2種類の有効成分の忌避剤が市販されています。

**忌避剤**の使用でマダニの付着数は減少しますが、マダニの付着を完全に防ぐわけではありません。忌避剤を過信せず、様々な防護手段と組み合わせて対策を取ってください。



## 5. 国内で入手できる忌避剤の種類と特徴

忌避剤	有効成分含有率	分類	効力持続時間	注意事項	特徴
ディート	5~10%	防除用医薬部外品	1~2時間	6ヶ月未満児には使用禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>・独特の匂い</li> <li>・べたつき感</li> <li>・プラスチック・化学繊維・皮革を腐食することもある</li> </ul>
	12%	防除用医薬品	約3時間		
	高濃度製剤 30%	防除用医薬品	約6時間		
イカリジン	5%	防除用医薬部外品	~6時間		
	高濃度製剤 15%	防除用医薬品	6~8時間		